

Modelos Lineares

Tabela de Anova de uma Regressão

- baixe o arquivo
regression.txt
- abra no Excel e calcule o intercepto e a inclinação do modelo linear
- crie uma coluna com os valores de resíduos do modelo para cada observação
- crie uma coluna com os valores de desvios quadráticos para cada observação
- calcule o valor de desvio total dos dados
- monte uma tabela de anova com os resultados
- calcule o r^2 (coeficiente de determinação) da regressão

Equações

Somas Quadráticas

$$\text{SS}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$$\text{SS}_{\text{error}} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$\text{SS}_{\text{total}} = \text{SS}_{\text{regr}} + \text{SS}_{\text{erro}}$$

Para o cálculo dos parâmetros da reta use as funções do Excell:

- INCLINAÇÃO
- INTERCEPÇÃO

Variáveis Dummies

- baixe o arquivo
colheita.csv
- abra no excel
- transforme a variável solo em dummy (3 novas colunas)
- salve o arquivo com texto e abra no R
- crie o modelo linear desses dados com as novas variáveis como preditoras

```
lmdummy <- lm(colhe ~ dummy1 + dummy2 + dummy3 , data = colheitaDummy)
## avalie o modelo
summary(lmdummy)
anova(lmdummy)
```

- ajuste o modelo normal de anova

```
lmAnova <- lm(colhe~solo, data=colheita)

## avalie o modelo
summary(lmAnova)
anova(lmAnova)
```

- compare os coeficientes dos dois modelos

From:

<http://labtrop.ib.usp.br/> - Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

Permanent link:

<http://labtrop.ib.usp.br/doku.php?id=cursos:planeco2019:roteiro:08-lm>



Last update: **2019/12/11 14:31**